

Service de Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la Reproduction Professeur Jean Marc AYOUBI – Chef de service

CONISATION

N 10 do 100 o	Date:
waname	Dale

Votre médecin vous a proposé une intervention *nommée conisation. La présente feuille a pour b*ut de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement par le médecin afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels de l'opération qu'il vous a conseillée. Les informations ci-dessous sont issues de la fiche d'information du CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) dans sa version rédigée en 1999, révisée en 2009 *(version actuellement en vigueur)*.

Qu'est-ce qu'une conisation?


La conisation consiste à enlever chirurgicalement une portion du col utérin.

La pièce prélevée est en forme de cône, sa base est plus ou moins large (1 à 2 cm), sa hauteur est en moyenne de 1,5 cm.

Elle est réalisée le plus souvent devant l'existence d'anomalies du col. En l'absence de traitement, ces lésions peuvent évoluer après plusieurs années vers un cancer du col de l'utérus, ce qui justifie l'ablation d'une portion de celui-ci.

L'intervention a deux buts principaux :

- 1- Elle permet de confirmer la nature exacte de la lésion et son étendue à la surface du col et dans la portion de canal cervical qui a été enlevée.
- 2- Elle est également thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle normalise le col et rend exceptionnelle l'évolution vers un cancer du col.



Comment se passe l'opération ?

L'intervention peut être réalisée sous anesthésie générale, loco-régionale (péridurale, rachianesthésie), ou locale selon votre cas et votre préférence.

La conisation s'effectue par les voies naturelles.

Soins/formulaire/138

Elle peut être réalisée à l'aide d'un bistouri, d'une anse électrique ou d'un laser.

L'utilisation d'une anse électrique est la plus fréquente.

Existe-t-il des inconvénients ou des risques ?

La conisation est une intervention fréquente, rapide, qui comporte peu de risques.

Le principal risque est hémorragique. Le risque de saignement existe dès les premières heures, et pendant les 15 jours suivant l'intervention

La survenue d'un saignement continu doit faire consulter dès que possible votre médecin.

Cela peut nécessiter la mise en place d'un tamponnement par une mèche (compresse) vaginale. Dans de rares cas, l'hémorragie peut nécessiter une réintervention.

La conisation ne provoque aucune douleur post-opératoire, éventuellement une gêne transitoire évoquant des règles douloureuses.

Cette opération préserve la possibilité de grossesse ultérieure. Les conséquences sur la fécondité sont rares. Il existe une légère augmentation du risque d'accouchement prématuré pour les grossesses ultérieures, et il conviendra de signaler cet antécédent de conisation au(x) professionnel(s) qui suivra (ont) votre (vos) prochaine(s) grossesse(s).

Tardivement, un rétrécissement (sténose) du col peut survenir et empêcher l'écoulement normal des règles et la surveillance ultérieure du col. Cette sténose peut nécessiter une simple dilatation et plus rarement une nouvelle intervention. Rarement, elle peut entraîner des difficultés d'ouverture du col au moment d'un accouchement.

Certains risques peuvent être favorisés par votre état, vos antécédents ou par un traitement pris avant l'opération.

Il est impératif d'informer le médecin de vos antécédents (personnels et familiaux) et de l'ensemble des traitements et médicaments que vous prenez.

En pratique

Avant l'opération :

- une consultation pré-anesthésique doit être réalisée systématiquement avant toute intervention sous anesthésie générale ou loco-régionale ;
- vous serez hospitalisée le matin même ou la veille de l'opération ;
- une perfusion sera mise en place puis l'anesthésie sera effectuée.

Après l'opération :

- en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale, vous passerez en salle de réveil avant de retourner dans votre chambre ;
- la sortie a généralement lieu le jour même ;
- une mèche ou compresse est parfois laissée en place dans les suites immédiates et retirée avant votre sortie;
- il est recommandé d'attendre environ un mois après l'opération pour reprendre une activité sexuelle ;
- évitez les longs déplacements et les activités sportives soutenues dans les 20 jours qui suivent ;
- évitez les bains pendant 15 jours. Les douches sont sans problème ;
- l'examen histologique de la pièce de conisation est très minutieux; le résultat de cette analyse vous sera communiqué par votre médecin et éventuellement commenté lors de la visite postopératoire;
- si des saignements d'abondance supérieure à des règles apparaissent après votre retour à domicile, il est indispensable de consulter en urgence dans l'établissement de soins qui vous a pris en charge et/ou d'informer votre médecin;
- il est indispensable de vous revoir en consultation post-opératoire après l'intervention.

Cette feuille d'information ne peut sans doute pas répondre à toutes vos interrogations. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser au médecin toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, oralement ou en utilisant la case suivante :

Questions et commentaires :	

Soins/formulaire/138 conisation V2 mai 2017



Je, soussignée

Coller étiquette patiente (obligatoire)

atteste	avoir é	té informée	oar le Docteur	
le	/	/20		
au'il éta	ait oppo	rtun de réal	ser une conisation.	

- ✓ Je reconnais que ce médecin m'a informée :
 - de mon état de santé,
 - des bénéfices, des risques et des contraintes de l'acte envisagé en fonction de mon état de santé
 - des bénéfices et des risques des éventuelles alternatives thérapeutiques.
- ✓ Je reconnais avoir lu attentivement la fiche d'information ci-dessus intitulée « conisation » (CNOF, version 1999 révisée en 2009) et avoir compris son contenu ainsi que les informations et recommandations qui m'ont été transmises. J'ai également pu poser toutes mes questions et obtenu des réponses claires de la part du médecin.
- ✓ J'ai été prévenue, qu'au cours de l'acte envisagé, une découverte ou un événement imprévu pourrait conduire le médecin à l'étendre en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement, voire à interrompre le protocole envisagé.
- √ J'autorise, dans ces conditions, l'opérateur à effectuer tout acte ou prescription qu'il
 estimerait nécessaire.
- ✓ J'ai disposé d'un délai de réflexion suffisant et m'estime désormais éclairée pour prendre une décision en toute connaissance de cause, **j'accepte l'acte proposé**.

Lieu,	le(date)	(obligatoire)
-------	-----	-------	---------------

Signature de la patiente (obligatoire)

DROIT D'ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES : conformément aux dispositions de la CNIL, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition à la transmission de vos données, y compris des données génétiques et des origines ethniques, couvertes par le secret professionnel susceptibles d'être utilisées dans le cadre des programmes de recherche et d'être traitées. Ces droits s'exercent auprès de votre médecin référent qui seul connaît votre identité.

RECHERCHE: Vous êtes hospitalisée dans un hôpital universitaire, sauf opposition de votre part, vos données personnelles codées (sans vos noms et prénoms) peuvent être utilisées pour la recherche.